CAPdouleur
CHANGE ANIMAL PAIN

VPLUS
RESEAUX INDÉPENDANTS
DES VÉTÉRAIRES

HOSPITALISATION ET DOULEURS PÉRI-OPÉRATOIRES ACTUALITÉS 2022

Thierry Poitte DMV DIU Douleur CES Traumatologie et Chirurgie Ostéo-Articulaire île de Ré 2022

1

Zone d'hyperalgésie primaire

Ligne d'incision

Zone d'hyperalgésie secondaire

2

3

4

5

Sensibilisation neuronale centrale

Lames de Rexed Plasticité du récepteur NMDA Activation gliale

The top part of the image shows a photograph of a rat's skin with a **Ligne d'incision** (incision line) and a **Zone d'hyperalgésie primaire** (primary hyperalgesia zone) indicated by a red circle. A larger **Zone d'hyperalgésie secondaire** (secondary hyperalgesia zone) is shown by a dashed red circle.

The bottom part features a diagram of **Libération axonale de glutamate** (axonal glutamate release). It shows a presynaptic terminal with **Glutamate**, **SN**, **Polysémine**, **Glycine**, and **Protéine**. Upon **Exposition Mg²⁺**, **Ca²⁺** enters the cell, leading to **Libération axonale de glutamate**. This causes **Excitation NMDA** and **Entrée massive de Ca²⁺ dans la cellule**, which activates **PKC, PKB, et cellules gliales**. The diagram also shows **Stimuli: récepteurs NMDA** and **Depolarisation**.

6

Sensibilisation périphérique et centrale

↓

Persistance des mécanismes de sensibilisation en l'absence de stimulations nociceptives DCPO

7

Chronic postsurgical pain: still a neglected topic?

DCPO

- Thoracotomie** (Edonis 2011): DC 40%, DC sévère 8%, DN 33%
- Sternotomie**: DC 36%, DC sévère 5%, DN 17%
- Greffon iliaque** (Martinez, Soumis pain): DC 12-40%, DC sévère 6%, DN 23%
- Hernie inguinale** (Edonis 2011): DC 18%, DC sévère 3%, DN 12%
- PTG** (Wylie, Pain 2011): DC 44%, DC sévère 15%, DN 6%

8

- 18,3% population opérée - 50% de DN - 66% sur les membres
- DCPO, 2ème cause de consultation dans les CETD
Crombie et al. Pain 1998, SFETD 2007; Allemagne 2009; Hong-Kong, 2009
- Douleur neuropathique part importante dans DCPO
Edonis 2011, SFAR Abstract 078

Mölsä et al. BMC Veterinary Research 2014, 18:206
http://www.biomedcentral.com/1746-1016/18/206

BMC
Veterinary Research

RESEARCH ARTICLE Open Access

Long-term functional outcome after surgical repair of cranial cruciate ligament disease in dogs

Sari H Mölsä*, Heikki Hyytiäinen, Anna K Hietniemi-Björkman and Outi M Laitinen-Vapaavuori

Abstract
Background: Cranial cruciate ligament (CCL) rupture is a very common cause of pelvic limb lameness in dogs. Few studies, using objective and validated outcome evaluation methods, have been published to evaluate long-term (>1 year) outcome after CCL repair. A group of 47 dogs with CCL rupture treated with intracapsular, extracapsular, and osteotomy techniques, and 21 healthy control dogs were enrolled in this study. To evaluate long-term surgical outcome, at a minimum of 15 years after unilateral CCL surgery, force plate, orthopedic, radiographic, and physiotherapeutic examinations, including evaluation of active range of motion (AROM), symmetry of thrust from the ground, symmetry of muscle mass, and static weight bearing (SWB) of pelvic limbs, and geometry of the stifle and tarsal joints, were done.
Results: At a mean of 25.8 ± 0.9 years after surgery, no significant differences were found in average ground reaction forces or SWB between the surgically treated and control dog limbs, when dogs with no other orthopedic findings were included (n = 21). However, in surgically treated limbs, approximately 30% of the dogs had decreased static or dynamic weight bearing when symmetry of weight bearing was evaluated, 40-50% of dogs showed limitations of AROM in stony position, and two-thirds of dogs had weakness in thrust from the ground. The stifle joint extension angles were lower (P < 0.001) and flexion angles higher (P < 0.001) in surgically treated than in contralateral joints, when dogs with no contralateral stifle problems were included (n = 33). In dogs treated using the intracapsular technique, the distribution percentage per limb of peak vertical force (PVF) in surgically treated limbs was significantly lower than in dogs treated with osteotomy techniques (P = 0.046).
Conclusions: The average long-term dynamic and static weight bearing of the surgically treated limbs returned to the level of healthy limbs. However, extension and flexion angles of the surgically treated stifle remained inferior to healthy joints, and impairment of AROM and weakness in thrust from the ground in the surgically treated limbs were frequently present. Ground reaction forces may be inadequate as a sole method for assessing functional outcome after cranial cruciate ligament repair.
Keywords: Cranial cruciate ligament, Surgical outcome, Force plate analysis, Concomity, Long-term, Dog

Background
 Cranial cruciate ligament (CCL) rupture is a common cause of canine pelvic limb lameness and stifle joint osteoarthritis. Surgical treatment is advocated to stabilize the stifle joint, alleviate pain, treat any concurrent musculoskeletal pathology, and decelerate the development of osteoarthritis [1]. Numerous surgical techniques have been developed and can be broadly classified as intracapsular ligament replacements, extracapsular suture techniques and neutralizing dynamic osteotomy techniques [2].
 The search for the most beneficial surgical technique is ongoing.
 The surgical outcome after CCL surgery has often been evaluated through clinical examination, radiography, and owner assessment. Force plate analysis has been the gold standard for objective evaluation of dynamic weight bearing, and it has also been used to evaluate outcomes of CCL repair [3-12]. All studies report significant improvement of dynamic weight bearing after surgery, but the results are more variable when return to the level of healthy limbs is considered. In clinical patients, some studies have reported return of dynamic weight bearing to the level of healthy limbs after extracapsular repair [5] and tibial

Table 1 Stifle joint findings of the surgically treated limbs: orthopedic and radiographic examination

	Severity of stifle joint findings			
	No findings	Mild	Moderate	Severe
Pain response to stifle flexion/extension (n = 47)	66.7% (32)	25.9% (12)	6.4% (3)	—
Flexion/extension (n = 47)	36.2% (17)	36.2% (17)	15.2% (7)	12.4% (6)
Crepitation (n = 47)	6.4% (3)	34.3% (16)	55.7% (26)	3.7% (2)
Cranial drawer sign (n = 39)	69.2% (27)	15.4% (6)	12.8% (5)	2.6% (1)
Radiographic OA (n = 46)	3.2% (1)	19.6% (9)	45.6% (21)	32.6% (15)

Results are expressed as percentages (number of dogs, n, number of dogs evaluated, OA, osteoarthritis).

Table 2 Dynamic and static weight bearing in subgroup 1, surgical technique groups and control dogs

	Subgroup 1 (n = 21)			Intra (n = 7)			Extra (n = 11)			Control group (n = 21)	
	CTL	ITL	SWB	CPL	ITPL	SWB	CPL	ITPL	CPL	ITL	PL
Force plate analysis											
PVF (N/limb)	117.8 (3.2)	117.3 (8.7)	20.6 (3.8)	21.3 (7.3)	57.2 (7.6)	25.1 (8.9)	NA	73.2 (8.8)	73.2 (8.8)	121.4 (10.0)	122.1 (8.0)
WT (N/limb)	19.2 (1.5)	18.3 (1.3)	8.7 (1.2)	9.4 (1.5)	8.3 (0.8)	9.5 (1.7)	NA	9.2 (1.3)	9.5 (1.3)	16.2 (1.1)	8.7 (0.8)
SWP (°)	31.6 (1.1)	30.8 (1.3)	18.3 (1.8)	18.6 (1.4)	17.6 (1.3)	19.9 (1.2)	NA	19.2 (0.9)	19.7 (0.9)	31.2 (1.1)	18.7 (1.1)
Static weight bearing											
SWB (%)	NE	NE	15.3 (0.4)	19.7 (0.6)	13.8 (1.2)	21.2 (1.2)	NA	16.8 (1.2)	19.8 (0.9)	NE	17.7 (2.8)

CTL: contralateral Th limb; ITL: ipsi; CPL: Contralateral pelvic limb

30% DCPO

9

ORIGINAL ARTICLE - CLINICAL

The influence of the choice of preemptive analgesia on long-term postsurgical pain after tibial plateau leveling osteotomy in dogs

William Pownall DVM, Ulrich Rytz DVM, DECVS, Gertraud Schuepbach DVM, DECVPH, Claudia Spadavecchia DVM, DECVAA, Helene Rohrbach DVM, DECVAA

First published: 21 September 2020 | <https://doi.org/10.1111/vsu.13515>

- Etude rétrospective: 120 chiens TPLO (2012 à 2016)
- **41% DCPO**
- *malgré les mesures analgésiques préventives mises en place*
- Helsinki Chronic Pain Index (HCPI) avant et 6 mois après la chirurgie
- Score HCPI > 12: indicatif de douleur
- Anesthésie épidurale: 13 / 28
- Anesthésie rachidienne: 11 / 32
- Bloc sciatique et fémoral: 28/80
- Suivis sur 6 mois: 25/67

10

11

12

1° IDENTIFICATION AV ET DCPO
RECOMMANDATION 1.1

Identification des animaux vulnérables

- Antécédents de douleurs pré-opératoires
- Pathologies associées
- Ancienneté des lésions
- Anxiété Dépression

13

1° IDENTIFICATION AV ET DCPO
RECOMMANDATION 1.1

Identification des animaux vulnérables

CAPdoulleur : Soigner l'animal douloureux

- Avec son histoire et son identité replacées dans son environnement émotionnel et cognitif
- Grâce à un projet thérapeutique global et individualisé
- Empruntant un parcours de soins
- Au sein de l'alliance thérapeutique avec son propriétaire

14

- Vulnérabilité (Douleurs chroniques)
- Anxiété pré-opératoire
- Caractéristiques de DN
- ! Trajectoire douloureuse élevée en post-op immédiat
- Durée prolongée de douleur intense

15

1° IDENTIFICATION AV ET DCPO
RECOMMANDATION 1.2

Identification des chirurgies pourvoyeuses de DCPO

- Mammectomies
- Chirurgies ostéo-articulaires
- Amputations
- Thoracotomies
- Ostectomies BT
- Durée
- Reprises
- Risque +++ de lésion nerveuse sur un tissu cicatriciel remanié

16

1° IDENTIFICATION AV ET DCPO RECOMMANDATION 1.3

Evaluation de la douleur per-opératoire

Stabilité anesthésique évaluée par:

- FR
- FC
- PA
- Consommation Isoflurane

Qualité analgésie évaluée par:

- Synchronisation stimuli nociceptif et réaction Animal
- Nociception interdite
- Variabilité fréquence cardiaque = Exploration SNA
- Indice PTA (0 à 100) = Activité SNPΣ

17

1° IDENTIFICATION AV ET DCPO RECOMMANDATION 1.3

Evaluation de la douleur post-opératoire

Intensité de la douleur post-opératoire immédiate corrélée avec incidence DCPO

18

SAVOIR FAIRE OPÉRATIONNEL

CAPdouleur

Evaluation de la douleur post-opératoire

Chat

Utiliser la grille multicritères ci-dessous pour détecter et quantifier la douleur

CHERCHE DE DOULEUR		Pas de douleur	
APPREHENSION GLOBALE SUBJECTIVE	Douleur intolérable	☐	☐
ATTITUDE GÉNÉRALE	PARMI LES SYMPTÔMES SUIVANTS : • présente des modifications respiratoires •ousse le dos • reste figé en posture analgique • s'agite, se plaint ou reste prostré au fond de la cage • ne se lève plus • regard, morille ou lèche sa plaie • urine ou défèque sous lui • perd l'appétit - Aucun signe présent - 1 seul présent - 2 à 4 présents - 5 à 8 présents	☐	☐
COMPORTEMENT INTERACTIF	Est attentif et répond aux caresses, à la voix Répond facilement Ne répond pas immédiatement Ne répond pas ou répond de façon agressive	☐	☐
RÉACTION À LA MANIPULATION DE LA ZONE OPÉRATOIRE	Pas de réaction visible ou audible - après 4 manipulations Réactions visibles ou audibles - à la 1 ^{re} manipulation - à la 2 ^e ou 3 ^e manipulations - à la 4 ^e manipulation ou non évaluable	☐	☐
INTENSITÉ DE CETTE RÉACTION	Aucune réponse Répond faiblement, essaye de se soustraire Tousse la tête ou vacille Tente de fuir ou d'agresser ou non évaluable	☐	☐
SCORE TOTAL	1 à 5 : douleur légère 6 à 10 : douleur modérée 11 à 15 : douleur sévère	☐	☐

Source : LAUVET

19

Composante Comportementale

Impact
Qualité de vie ?

Vocalises

Gémissements
Grondements
Hurlements

20

Composante Comportementale

Impact
Qualité de vie ?

Expressions faciales

« à l'écoute de l'environnement » : Oreilles dressées - Pavillons orientés vers l'avant - Frémissement des vibrisses

21

LE BÉBÉ DOULOUREUX
Evaluation de la douleur

Mediastil - Neonatal Facial Coding System (NFCS)

Neonatal Facial Coding System (NFCS)

Age d'utilisation
■ Elaborée pour le nouveau-né, utilisée jusqu'à 18 mois.

Type de douleur évaluée
■ Douleur aiguë, douleur des soins médicaux.

Items
■ Score initialement publié avec 10 items, validé dans sa version raccourcie à 4 items.

Spécificité
■ Cette échelle se réfère uniquement à la grimace pour mesurer la douleur. Elle ne sert pas à un diagnostic étiologique de la genèse de douleur chez le nouveau-né. La sémiologie du visage est très fine. Le calcul du score se fait au mieux à partir d'un enregistrement vidéo de l'enfant.

Score
■ De 0 à 10 dans la version 10 items, de 0 à 4 dans la version 4 items.
C'est une échelle validée.

1. SOURCILS FRONCES, plissés; sillons entre les sourcils
2. PAUPIERES SERREES yeux fermés
3. SILLON NASO-LABIAL accentué
4. BOUCHE ouverte

LANGUE tendue creusée
MENTON tiré en bas
BOUCHE étirée en hauteur
BOUCHE étirée en largeur
LEVRES faisant la moue
Protrusion de la LANGUE

OUCHER!		OUCHER!		OUCHER!	
10		10		10	
9		9		9	
8		8		8	
7		7		7	
6		6		6	
5		5		5	
4		4		4	
3		3		3	
2		2		2	
1		1		1	
0		0		0	

Enfants de 3 à 12 ans

22

1980 Ekman: Facial Action Coding System ou FACS

Mise en évidence 43 muscles faciaux capables de produire environ 10 000 expressions, dont 3 000 porteuses de sens

Le FACS est constitué de 46 Aus (Unités d'action) qui permettent de décrire n'importe quelle expression faciale, qu'elle soit associée ou non à un état interne, comme des émotions ou de la douleur

# AU	Mouvement facial	Muscle(s)	Exemple
4	Abaissement et rapprochement des sourcils	<i>Corrugator supercilii</i> <i>Depressor supercilii</i>
6	Remontée des joues	<i>Orbicularis oculi, pars orbitalis</i>
7	Tension des paupières	<i>Orbicularis oculi, pars palpebralis</i>
9	Plissement de la peau du nez vers le haut	<i>Levator labii superioris alaque nasi</i>
10	Remontée de la partie supérieure de la lèvre	<i>Levato labii superioris</i>
43	Yeux fermés	Relaxation du <i>Levator palpebrae superioris</i> ; <i>Orbicularis oculi, pars palpebralis</i>

6 AUs sont reconnues comme constituant l'expression faciale de la douleur

23

AU 6 et 7
Composante sensori-discriminative

AU 4 9 et 10
Composante émotionnelle
Autres états émotionnels désagréables: dégoût et colère

Combinaison de AUs 4 + 6-7 + 9-10 + 43: spécifique à l'expression de douleur

# AU	Mouvement facial	Muscle(s)	Exemple
4	Abaissement et rapprochement des sourcils	<i>Corrugator supercilii</i> <i>Depressor supercilii</i>
6	Remontée des joues	<i>Orbicularis oculi, pars orbitalis</i>
7	Tension des paupières	<i>Orbicularis oculi, pars palpebralis</i>
9	Plissement de la peau du nez vers le haut	<i>Levator labii superioris alaque nasi</i>
10	Remontée de la partie supérieure de la lèvre	<i>Levato labii superioris</i>
43	Yeux fermés	Relaxation du <i>Levator palpebrae superioris</i> ; <i>Orbicularis oculi, pars palpebralis</i>

Douleur simulée: les AUs apparaissent dans un ordre séquentiel avec chevauchement
Douleur authentique: les AUs apparaissent en même temps (synchronisées).

24

Head position

0 = absent 1 = moderately present 2 = markedly present

Head above the shoulder line

Head aligned with the shoulder line

Head below the shoulder line or tilted down (chin toward the chest)

OR

27

AUCUNE DOULEUR OU DOULEUR LÉGÈRE

0 - l'unité d'action est absente

- Oreilles vers l'avant
- Yeux ouverts
- Museau relâché (forme arrondie)
- Moustaches détendues et courbées
- Tête au-dessus de la ligne des épaules

DOULEUR LÉGÈRE À MODÉRÉE

1 - l'unité d'action est modérément présente ou il y a de l'incertitude quant à sa présence

- Oreilles légèrement écartées
- Yeux entrouverts
- Légère tension du museau
- Moustaches légèrement courbées ou droites
- Tête au niveau de la ligne des épaules

DOULEUR MODÉRÉE À INTENSE

2 - la présence de l'unité d'action est évidente

- Oreilles à plat ou tournées vers l'extérieur
- Yeux plissés
- Museau tendu (forme elliptique)
- Moustaches droites et orientées vers l'avant
- Tête sous la ligne des épaules ou penchée vers le bas

28

L'interprétation des EFE dépend étroitement du contexte dans lequel elles sont jugées

1° Autres significations

- interaction agonistique (agressif)
- peur
- particularités raciales

- Interaction selon approche soignant

29

L'interprétation des EFE dépend étroitement du contexte dans lequel elles sont jugées

2° Particularités raciales

L'interprétation des EFE chez le chat a été réalisée sur des chats européens à poil court
DSH Domestic short hair

Mésocéphales Birman - British longhair - American shortair
Main Coon - Norvégien - Ragdoll - Bleu Russe

30

L'interprétation des EFE chez le chat a été réalisée sur des chats européens à poil court
DSH Domestic short hair

<p>Dolichocéphales Abyssin – Bengali – Egyptien Oriental Shortair – Sphynx</p> <p>Extrapolable malgré faible cohorte</p>	<p>Brachycéphales American shortair – Bombay – Devon Rex Exotic shortair – Persan – Scottish fold</p> <p>Non validée et utilisable</p>
--	--

Chevauchement considérable entre les scores de douleur dans la population DSH « douleur » et les visages neutres d'autres races: un profil neutre de brachycéphale apparaît comme une grimace de douleur pour un chat de gouttière.

31

L'interprétation des EFE dépend étroitement du contexte dans lequel elles sont jugées

3° ! Multimorbidité (hypoK)
MRC ⇔ déséquilibre ionique ⇔ hypoK ⇔ Faiblesse musculaire ⇔ Ventroflexion cervicale

32

L'interprétation des EFE dépend étroitement du contexte dans lequel elles sont jugées

4° ! Douleur aigue = grimace ≠ douleur aigue prolongée

5° Plusieurs chercheurs ont observé que l'affichage d'une EFE dépend en premier lieu du contexte d'émission, ce qui tend à suggérer qu'un certain nombre de mouvements faciaux, plutôt que d'être le reflet direct d'un état interne, seraient surtout communicatifs (Bavelas & Chovil, 1997)

Par conséquent, la signification d'un comportement expressif (expression faciale ou posturale) correspond à son caractère « intentionnel », c'est-à-dire impliquant une relation entre un sujet et un objet vers lequel le sujet s'oriente.

33

a

b

c

Dr Ryota Watanabe

- Vulnérabilité
- Trajectoire douloureuse élevée en post-op immédiat
- Durée prolongée de douleur intense
- Caractéristiques de DN

DCPO

34

35

36

37

38

Douleurs aiguës

Observations avec interactions avant la chirurgie

39

40

41

Reconnaître la douleur chez le chat

Le croissant

La douleur est bien contrôlée chez ce chat. Les oreilles sont dressées et orientées vers l'avant, les yeux ne sont pas plissés. Une ligne horizontale passant par le centre des yeux peut être tracée. Le dos est peu arqué, le chat semble alerte ; la posture de ses pattes est relâchée, en croissant.

Le bigleux

Les chats avec la tête basse, les oreilles flasques, les yeux mi-clos et un peu loucheur peuvent souffrir. Il est important de remarquer que la ligne passant par le centre des yeux dessine un V.

Le bossu

Un chat en position bossue, les pattes raides, assis en silence au fond de sa cage peut souffrir. Ce chat présente également des oreilles flasques et des yeux mi-clos. C'est une posture courante après une chirurgie abdominale.

Le raplapla

Les chats en décubitus latéral, les pattes raides, peuvent ressentir une douleur importante. Ces chats ont également une expression faciale douloureuse : les oreilles sont flasques et les yeux mi-clos.

L'intouchable

Les chats qui, auparavant faciles à manipuler, sifflent, crachent, essaient de griffer ou de mordre en réaction à une simple pression sur la plaie, ou d'une manière générale, les chats qui refusent la manipulation peuvent ressentir une douleur. La réaction du chat peut être considérée comme proportionnelle à la douleur qu'il éprouve.

42

43

44

45

46

2° SEDATION DE QUALITE

Jeûne pré-anesthésique 6h, dernier repas sous forme humide ½ dose

SEDATION	ANALGESIE
Médétomidine	Méthadone
Midazolam	Fentanyl
Diazepam	Buprénorphine
ACP	Morphine
	(Butorphanol)
	Maropitant

Attendre 5-15mn Aucune stimulation

- ☞ Préemptive Analgésie
- ☞ Prévention peur et anxiété
- ☞ Induction en douceur + Réveil au calme ⇒ ↓ Stress (catécholamines)
- ☞ ↓ Concentration Isoflurane
- ☞ ↗ Myorésolution
- ☞ ↓ Effets II des agents anesthésiques

47

	Neuroleptiques Acépromazine Calmivet 0,5% 5mg/ml	BZD Diazépam Valium 10mg/2ml Midazolam Hypnovel 1mg/ml	OPIOÏDES Butorphanol Butador 10mg/2ml	α2 Agonistes Médétomidine Domitor 1000µg/ml
Posologies	0,05mg/kg 1ml/100kg	Valium 0,25mg/kg IV 0,5ml/10kg Hypnovel 0,2mg/kg IV 2ml/10kg	0,1-0,4mg/kg 0,1-0,4ml/10kg IM	5-10µg/kg
Sédation	++	+	+++	+++
Analgésie	0	0	+	++
Avantages	Effet sédatif dose dépendant	Anxiolytique Myorelaxation Antagonisable	Antagonisable Dépression respiratoire minime	Anxiolytique Myorelaxation Antagonisable
Inconvénients	Hypotension Latence longue Non antagonisable	Désorientation Désinhibition	Faible analgésie du Butorphanol Surveiller Dépression respiratoire	Hypertension Vasoconstriction Bradycardie BAV2 RVP!

48

PRÉMÉDICATION ANESTHÉSIQUE (CHIEN ET CHAT)					
ASSOCIATION*		PUISANCE SÉDATIF** (0-10)	VOIE	REMARQUES	
PRODUIT 1	PRODUIT 2				
Acépromazine 0,02 - 0,05 mg/kg	Butorphanol 0,1 - 0,4 mg/kg	5	IV / IM	Sédation et/ou douleur légère et/ou effet antitussif	
	Buprénorphine 20 µg/kg 20 - 30 µg/kg	5	IV / IM	Douleur légère avec une action de plus longue durée	
	Méthadone 0,2 - 0,3 mg/kg	6	IV / IM	Douleur modérée à sévère	
Médétomidine 5 - 20 µg/kg 10 - 40 µg/kg ou Dexmédétomidine 2 - 10 µg/kg 5 - 20 µg/kg	Butorphanol 0,1 - 0,4 mg/kg	7	IV / IM	Douleur légère plutôt viscérale	
	Buprénorphine 20 µg/kg 20 - 30 µg/kg	7	IV / IM	Douleur légère à modérée	
Médétomidine 5 - 20 µg/kg 10 - 40 µg/kg ou Dexmédétomidine 2 - 10 µg/kg 5 - 20 µg/kg	Méthadone 0,2 - 0,3 mg/kg	8	IV / IM	Douleur sévère	
	Midazolam 0,2 - 0,3 mg/kg	6	IV / IM	Patients ASA 1-2 avec une fonction cardiovasculaire normale Procédures peu douloureuses telles que l'imagerie Voie IM : injecter simultanément	
Dexmédétomidine 2 - 10 µg/kg 5 - 20 µg/kg	Diazépam 0,2 - 0,3 mg/kg	6	IV	Voie IV : privilégier les doses plus faibles et commencer par l'injection de (dex)médétomidine, attendre 2 min et poursuivre avec l'injection de la benzodiazépine (Dex)médétomidine contre-indiquée en cas de valvulopathie ou perte de contractilité	
	Méthadone 0,2 - 0,3 mg/kg	5	IV / IM	Patients ASA 4-5 Parfois peu sédatif, mais excellente stabilité cardiovasculaire Méthadone contre-indiquée en cas de bradycardie préexistante	
Midazolam 0,3 - 0,4 mg/kg	Méthadone 0,2 - 0,3 mg/kg	5	IV / IM	Patients ASA 4-5 Parfois peu sédatif, mais excellente stabilité cardiovasculaire Méthadone contre-indiquée en cas de bradycardie préexistante	
PRODUIT 1 Dexmédétomidine 5 µg/kg 10 µg/kg	PRODUIT 2 Butorphanol 0,2 mg/kg	PRODUIT 3 Midazolam 0,2 mg/kg	10	IM	Plutôt patients ASA 1-2 avec une fonction cardiovasculaire normale Très bonnes myorelaxation et sédation, analgésie légère à modérée Possible de rajouter méthadone dans un deuxième temps si analgésie insuffisante Contre-indiquée en cas de valvulopathie ou perte de contractilité

* Administrer tous les agents de prémédication au moins 10 min avant induction, sauf acépromazine et buprénorphine (30-45 min avant induction)
 ** Puissance sédatif à titre indicatif. Un protocole comprenant une prémédication avec une puissance sédatif plus élevée nécessitera une dose plus faible d'agent d'induction anesthésique.
 *** Score ASA (American Society of Anesthesiology) : classification permettant d'évaluer le risque anesthésique d'un individu selon l'état de santé

Dechra
 CAPdouleur
 CHIRURGIE ANIMALE PARIS

49

PRE-ANESTHÉSIE

MEDETOMIDINE
α2 Agoniste
Doses: 5-10µg /kg

+

METHADONE
Opioïde fort agoniste µδκ
Doses: 0,2 – 0,3 mg/kg

PROPOFOL
Dépression SNC par fixation sur GABA
Sédation à perte de conscience sans analgésie
Faible cardio-dépresseur - vasodilatateur
Dépression respiratoire modérée
Élimination très rapide (+ lent chez le CT)
Doses: à effet

+

KETAMINE À dose anti-hyperalgésique
Hémodynamique: pas d'effet
Respiratoire: pas d'effet
Pas de Nausées et vomissements
Pas de retard de réveil
Pas de dysphorie
Doses: 0,5 - 1 mg/kg

50

PRE-ANESTHESIE

MIDAZOLAM 5 mg/ml
BZD
Doses: 0,2 – 0,3 mg/kg
0,4 -0,6 ml/10kg

METHADONE 10mg/ml
Opiode fort agoniste µδκ
Doses: 0,2 – 0,3 mg/kg
0,2 -0,3 ml/10kg

51

MAROPITANT

Inhibiteur Récepteur NK1

Abstract

Objective: To evaluate the NK1 receptor antagonist maropitant in dogs during and after surgery.

Methods: 30 healthy, female dogs were randomly divided to receive either a pre-operative dose of maropitant (1 mg/kg SC) or morphine (0.1 mg/kg SC) 30 minutes before surgery.

Results: All dogs tolerated maropitant during routine anesthesia. The pre-operative group had lower scores for vomiting, regurgitation, and nausea during and after surgery compared to the morphine group.

Cerenia Prevents Perioperative Nausea and Vomiting and Improves Recovery in Dogs Undergoing Routine Surgery

Abstract: Cerenia was associated with a significantly lower mean number of vomiting and regurgitation events compared to placebo-treated dogs. The present study investigated the effects of cerenia on peri-operative nausea and vomiting in dogs that had undergone orthopedic surgery.

- ↳ Prévention nausée
- ↳ Prévention vomissement
- ↳ Effet analgésique:
1 mg/kg de maropitant
= 0,5 mg/kg de morphine (ovariectomies)
- ↳ Pas de ≠: FC, PA, FR
- ↳ ↘ Nausées post-op
- ↳ ↗ Reprise appétit

52

53

	Fentanyl <i>Agoniste μδκ</i>	Morphine <i>Agoniste μδκ</i>	Méthadone <i>Agoniste μδκ</i>	Buprénorphine <i>A. partiel μδκ</i>	Butorphanol <i>Agoniste δκ</i> <i>Antagoniste μ</i>
	50μg/ml	10mg/ml	10mg/ml	0,3mg/ml	10mg/ml
	Fentanyl	Morphine 1%	Comfortan	Vetergésic Buprecare	Butador Dolorex
Activité	+++(+)	+++	+++	++	+
Affinité	+++	+	++	+++	++
Délai d'action	2-5mn	IV: 5-10mn SC: 10-15mn	IV: 10mn IM: 15mn	IV IM: 30-45mn	IV: 15mn
Durée d'action	20mn	CN: 2-4h CT: 4-6h	CN: 3-4h	6-10h	CN: 1-2h CT: 6h
Doses Chien	2,5-5μg/kg 0,5-1ml/10kg IV IM	0,25-0,5mg/kg 0,25-0,5 ml/10 kg IV IM SC	0,2-0,3mg/kg 0,2-0,3 ml/10 kg IV IM	20μg/kg 1ml/15kg IV IM	0,1-0,4mg/kg 0,1-0,4ml/10kg IV IM
Doses Chat	2,5μg/kg 0,25ml/5kg IV IM	0,1-0,2mg/kg 0,05-0,1 ml/5 kg IV IM SC	0,2-0,3mg/kg 0,1-0,15 ml/5 kg IV IM	20μg/kg 0,33ml/5kg IV IM	0,1-0,4mg/kg 0,1-0,4ml/10kg IV IM

54

55

56

METHADONE

Bonne molécule

Pharmacodynamie

- Opioïde fort: Agoniste plein $\mu \delta \kappa$
- Analgésique de Palier III (douleurs sévères)
- Antinociceptif opioïde (L-méthadone) dose-dépendant
- Efficacité +++
- Affinité: Morphine < Méthadone < Fentanyl < Buprénorphine
- Action sur Douleurs neuropathiques
- Pas d'hyperalgésie induite par les opioïdes

D-méthadone

Antagoniste des récepteurs NMDA

Agoniste plein des récepteurs opioïdes μ, δ, κ

L-méthadone

57

METHADONE VERSUS MORPHINE

Bonne molécule

Bonne dose

- Délai d'action: IV 10 mn
IM: 15 mn
- Durée d'action: 3 - 4h
- Doses: 0,2 - 0,3 mg/kg

	MORPHINE	METHADONE
Agonistes		Pleins $\mu \delta \kappa$
Délai et durée d'action		comparables
Activité et affinité		comparables
Anti-NMDA	Non	Oui
Douleurs neuropathiques	Non	Oui
Dépression respiratoire	++	+++ (0,3 mg/kg)
↑ FR		Halètement
Stabilité cardio-vasculaire		+
Vomissements - Nausées	Oui	Non
Histamino-libération	Oui	Non
1 ^{er} passage hépatique	Oui	Non VO possible ?
Voie transmucoale	Non	Oui
Voie péridurale	Oui	Non
AMM Vétérinaire	Non	Oui
Coût	+	+++
Législation		Stupéfiant

58

METHADONE

- Dépression respiratoire et bradycardie dose-dépendantes rares aux doses recommandées
 - ! Bradycardie pré existante
 - Halètement (CN)
 - Dysphorie (CT)
-
- Interdit / voie périurale (agent conservateur)
 - Blocage canaux K⁺ Herg (cardiaques)
Allongement QT et torsade de pointe à fortes doses
 - ! Dégradation / Cytochrome P450

59

60

61

CRI EN PRATIQUE

Associations possibles : Opiode (Méthadone ou Fentanyl) + Kétamine +/- Lidocaïne +/- Alpha 2-agoniste (Médétomidine ou Dexmédétomidine)

Molécule	Charge initiale Bolus en mL ¹ IV	A diluer ¹ dans 20 ml de NaCl		A diluer ¹ dans 50 ml de NaCl		A diluer ¹ dans 100 ml de NaCl		A diluer ¹ dans 500 ml de Ringer Lactate	
		Pousse-seringue : 1 mL/kg/h	Pousse-seringue : 1 mL/kg/h	Pousse-seringue : 1 mL/kg/h	Perfusion : 10 mL/kg/h	Perfusion : 10 mL/kg/h	Perfusion : 10 mL/kg/h	Perfusion : 10 mL/kg/h	
Méthadone 10 mg/mL ¹	0,2-0,3 mg/kg 0,2-0,3 mL /10 kg	0,1-0,2* mg/kg/h 0,2-0,4 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,5-1,0 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,1-0,2 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,1-0,2 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,1-0,2 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,5-1,0 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,5-1,0 mL	0,1-0,2* mg/kg/h 0,5-1,0 mL
Fentanyl 50 µg/mL ¹ chien chat	5 µg/kg 1 mL /10 kg 2,5 µg/kg 0,25 mL /5 kg	2,5-5 µg/kg/h 1-2 mL 2,5 µg/kg/h 1 mL	2,5-5 µg/kg/h 2,5-5 mL	2,5-5 µg/kg/h 0,5-1 mL	2,5 µg/kg/h 0,5 mL	2,5 µg/kg/h 0,5 mL	2,5-5 µg/kg/h 2,5-5 mL	2,5-5 µg/kg/h 2,5-5 mL	2,5-5 µg/kg/h 2,5-5 mL
Kétamine 100 mg/mL ¹	0,5-1 mg/kg 0,05-0,1 mL /10 kg	0,5 mg/kg/h 0,1 mL	0,5 mg/kg/h 0,25 mL	0,5 mg/kg/h 0,05 mL	0,5 mg/kg/h 0,05 mL	0,5 mg/kg/h 0,05 mL	0,5 mg/kg/h 0,25 mL	0,5 mg/kg/h 0,25 mL	0,5 mg/kg/h 0,25 mL
Médétomidine ² 1000 µg/mL ¹	2 µg/kg 0,02 mL /10 kg	2,5 µg/kg/h 0,05 mL	2,5 µg/kg/h 0,125 mL	2,5 µg/kg/h 0,03 mL	2,5 µg/kg/h 0,03 mL	2,5 µg/kg/h 0,03 mL	2,5 µg/kg/h 0,125 mL	2,5 µg/kg/h 0,125 mL	2,5 µg/kg/h 0,125 mL
Dexmédétomidine ² 500 µg/mL ¹	1 µg/kg 0,02 mL /10 kg	1,25 µg/kg/h 0,05 mL	1,25 µg/kg/h 0,125 mL	1,25 µg/kg/h 0,03 mL	1,25 µg/kg/h 0,03 mL	1,25 µg/kg/h 0,03 mL	1,25 µg/kg/h 0,125 mL	1,25 µg/kg/h 0,125 mL	1,25 µg/kg/h 0,125 mL
Lidocaïne 20 mg/mL ¹ chien	1-3 mg/kg 0,5-1,5 mL /10 kg	1-3 mg/kg/h 1-3 mL	1-3 mg/kg/h 2,5-7,5 mL	1-3 mg/kg/h 0,5-1,5 mL	1-3 mg/kg/h 0,5-1,5 mL	1-3 mg/kg/h 0,5-1,5 mL	1-3 mg/kg/h 2,5-7,5 mL	1-3 mg/kg/h 2,5-7,5 mL	1-3 mg/kg/h 2,5-7,5 mL

¹ Volume valable uniquement pour la concentration indiquée dans ce document - en cas d'utilisation d'un produit contenant une autre concentration, le volume doit être adapté
² Dexmédétomidine contre-indiquée en cas de vaskulopathie ou perte de contractilité
* Ne pas dépasser une durée de 4 heures à la dose maximale de méthadone (0,2 mg/kg/h)

Réalisé par
CAPdoulleur

Stabilité MeLK 48h
Gomez A et al . Stability of dilutions of methadone alone, and in combination with lidocaine and ketamine JSAP March 2022

62

63

64

Fentanyl 50µg/ml Fentadon	
Activité	Agoniste pur: μ δ κ +++(+)
Affinité	+++
Délai d'action	IV: 2-5mn
Durée d'action	20mn
Indications	Douleurs sévères à très sévères
Sédation	++ (à fortes doses)
Effets II	Dépression respiratoire: +++ Ω +(+) CN et CT ! Trauma thoracique Insuf resp. Mydriase CT Peu d'effets cardio-vasculaires (2 à 5x la dose: Bradycardie sans $\searrow$ DC et PA)
Antagonisation	Naloxone 0,04 mg/kg
Doses Chien	2,5-5µg/kg 0,5-1ml/10kg IV IM
Doses Chat	2,5µg/kg 0,25ml/5kg IV IM

Prémédication animaux critiques:
Fentanyl 50µg/ml
5µg/kg 1ml/10kg IV
+
Midazolam Hypnovel
1mg/ml
0,2mg/kg 2ml/10kg IV

65

Buprénorphine 0,3mg/ml Véteergésic	
Activité	Agoniste partiel μ ++ Effet plafond
Affinité	+++
Délai d'action	IV IM: 30 -45mn
Durée d'action	6-10h
Indications	Douleurs modérées
Sédation	+ (< butorphanol et méthadone)
Effets II	Ptyalisme CT: Mydriase Dysphorie
Antagonisation	Difficile
Doses Chien	20-30µg/kg 1ml/10-15kg IV IM
Doses Chat	20-30µg/kg 0,33-0,5ml/5kg IV IM Sublingual

Voie Transmuqueuse : +++ chez le Chat
pH basique de la cavité buccale qui favorise la forme non ionisée

66

Butorphanol 10mg/ml Butador Dolorex	
Activité	Antagoniste μ Agoniste κ + Effet plafond
Affinité	+++ > Fentanyl
Délai d'action	IM IV: 15mn
Durée d'action	CN: 1-2h CT: 6h Analgésie = 15 mn !
Indications	Douleurs légères Viscérales > Somatiques Antagoniste Morphine Antitussif
Sédation	+++
Effets II	Très peu d'effets digestifs Dépression respiratoire faible
Antagonisation	Antagonisation dépression respiratoire
Doses Chien	0,1-0,4mg/kg 0,1-0,4ml/10kg IM
Doses Chat	0,1-0,4mg/kg 0,1-0,4ml/10kg IM

Butorphanol 10mg/ml
0,1 mg/kg 1ml/100kg
+ Médétomidine 1000 μ g/ml
5-10 μ g/kg 1ml/200-100kg
Midazolam 1mg/ml
 $\pm$ 0,2 mg/kg 2ml/10kg IM IV

67

Antitussif
Butorphanol 10mg/ml VO
0,25-0,5mg/kg BID TID
0,25-0,5ml/10kg $\rightarrow$ 1gtte/2kg
Si >: effet sédatif marqué

68

69

TRAMADOL

DOULEURS NOCICEPTIVES

Activation brève des nocicepteurs

DOULEURS AIGUES NOCICEPTIVES
Traumatismes, brûlures, lésions vasculaires, lésions et obstructions viscérales, lésions et obstructions viscérales

AMM PALIER I Douleur faible à modérée → AINS

HORS AMM PALIER II Douleur modérée à sévère → Tramadol (Chien: 2-4 mg/kg BID; Chat: 2-2 mg/kg BID) / Buprénorphine

PALIER III Douleur sévère à très sévère → Méthadone / Fentanyl

Chirurgies pourvoyeuses de DPO et de DCPO

Palier II: modérées à sévères

Dans le cadre d'une analgésie multimodale

- Opioides forts
- ALR
- Anti-hyperalgésiques
- AINS
- Nursing

TID en fonction de l'intensité des douleurs

Au retour à domicile (en association avec un AINS)

70

TRAMADOL

Paracétamol + Tramadol (uniquement chien): Ixprim Tramadol 37,5 mg Paracétamol 325 mg
 Respecter posologie paracétamol 1 cp BID / 25 à 30 kg
 même si tramadol apparaît sous-dosé: 1-1,5mg/kg BID de Tramadol (effet synergique)

71

72

73