

Kératine hydrolysée : protection de la muqueuse, stoppe les saignements de la muqueuse, reste 12h dans l'estomac, participe à la cicatrisation, propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires

Alginate de sodium : polysaccharide d'algues marines, diminue le reflux gastro-oesophagien

Aloe vera : anti-inflammatoire et participe à la cicatrisation de la muqueuse

Acide hyaluronique et sulfate de chondroïtine : l'administration des deux améliore la douleur abdominale et l'inconfort associé à la gastrite

Zinc : antioxydant, intégrité des fonctions de barrière des muqueuses

Indications

Soutien de la muqueuse œsophagienne et gastrique

 Utilisation sur le long cours possible (absence de phosphate d'aluminium)

Mode d'emploi

Vetgastril Plus gel :

- **Chats et chiens** : 1 ml pour 5kg de poids par jour.
- **Furets, Rongeurs et Oiseaux** : 0,2 ml par kg de poids par jour.

Vetgastril Plus comprimés :

- **Chiens** : 1 comprimé pour 20kg de poids par jour.

A administrer en une ou deux prises par jour (en divisant la quantité journalière en deux, espacées de 12h). Prendre 1 à 2 heures avant l'alimentation quotidienne.



Accédez aux ressources détaillées
via ce QR code.



PHYSIOPATHOLOGIE

Sensibilité tactile : Fibres myélinisées A β	Présente	Absente
Localisation nocicepteurs	Peau Capsule articulaire Membrane synoviale Ligaments et tendons Périoste - Muscles Pulpe dentaire - Cornée ...	Paroi musculaire des viscères creux Capsule des viscères pleins Tissu conjonctif du péritoine pariétal
Signes neurovégétatifs (Nausées, vasoconstriction, tachycardie, hypertension...)	Habituellement absents ou peu marqués	Fréquents
Réponses émotionnelles	En relation avec la chronicisation de la douleur	Plus rapides et intenses

ÉVALUATION


Caractéristiques de la douleur	Précise Localisée	Sourde et diffuse, Mal localisée (Sauf douleur pancréatites localisable dans le quadrant antérieur D)
Douleur référée Ressentie à distance	Non	Oui Convergence viscéro-somatique médullaire
Voussure lombaire	Oui	Oui
Troubles de la démarche	Oui (boiteries ...)	Oui
Adoption de postures antalgiques	Tête basse (cervicalgie) Augmentation du polygone de sustentation Sloppy sit	Prosternation Position du prieur Recherche d'un endroit frais couchage sur des surfaces froides
Palpation vertébrale douloureuse	Fonction du site de la lésion	Habituellement non
Contractures musculaires	Fonction de l'articulation atteinte : iliopsoas et coxarthrose	Oui Boucles motrices réflexes
Palpation abdominale douloureuse	Parfois, selon l'attente de douleurs	Oui
Symptômes digestifs associés : vomissements, iléus ...	Habituellement non	Fréquents
Symptômes urinaires associés : anurie, dysurie, mictions incontrôlées ...	Parfois	Fréquents
Imagerie	Très souvent diagnostique	