



Approche pharmacologique des douleurs viscérales



OPIOÏDES

Méthadone 10mg/ml	Agoniste plein récepteurs μ , δ , κ Antagoniste récepteurs NMDA	Douleurs viscérales sévères de palier III Pancréatites aiguës du chien	Chiens 0,2-0,3 mg/kg = 0,2-0,3 ml/10 kg IV IM Action : délai = 3-5 min IV ; durée = 2-4 h CRI : 0,1-0,2 mg/kg/h Chats 0,2-0,3 mg/kg = 0,1-0,15 ml/5 kg IV IM Action : délai = 5-10 min IM ; durée = 4-6 h CRI : 0,1-0,2 mg/kg/h	Dépression respiratoire et bradycardie dose-dépendantes (rares aux doses recommandées) • Halètement (CN) • Dysphorie (CT)
Buprénorphine 0,3mg/ml	Agoniste partiel récepteurs μ	Douleurs viscérales modérées de palier II Cystites	Chiens 20 μ g/kg = 1ml/15 kg IV IM Action : délai = 30-45 min IV ; durée = 6-12 h Chats 20-30 μ g/kg = 0,33-0,5ml/5 kg IV IM TM Action : délai = 30-45 min IV ; durée = 6-10 h	Dépression respiratoire peu marquée Salivation (chez le chat, suite à l'administration TM : transmucoale) Dysphorie possible chez les animaux MDR-1 positifs

ANESTHÉSQUES LOCAUX

Lidocaïne 20mg/ml	Anesthésique local Anti arythmique Analgésique Antihyperalgésique Antiinflammatoire Prokinétique	Douleurs viscérales sévères de palier III Pancréatites aiguës du chien	Chiens 1-2mg/kg IV 0,5-1ml/10kg CRI : 1-3 mg/kg/h Chats Risque hypotension Diviser les doses / 2	Toxicité surtout neurologique (sédation, tremblements, convulsions) et cardiovasculaire (hypotension, arythmies) en cas de surdosage ou d'administration trop rapide
----------------------	---	---	---	--

PITANTS

Maropitant 10mg/ml	Antagoniste récepteurs NK1 Antivomitif Analgésique viscéral ?	Vomissements Douleurs viscérales sous couvert d'une évaluation	Chiens et chats 1mg/kg IV SC 1ml/10kg 2mg/kg VO	Douleur au point d'injection
-----------------------	---	---	--	------------------------------

ANTISPASMODIQUES

Spasmoglucinol Phloroglucinol	Spasmolytique musculotrope	Affections spasmodiques urologiques : - migration des calculs urinaires, - traitement de fond de la lithiase, - sondage urétral post chirurgical.	Chiens VO 1 cp/10kg BID Chats VO 1cp BID	Risque d'atonie digestive
Prifinium Prifinial 7,5mg/ml	Spasmolytique neurotrope anticholinergique	Affections spasmodiques digestives : diarrhée, douleurs spastiques, gastrite, météorisme et obstruction intestinale.	Chiens 1ml/8-10 kg IV IM SC Chats 0,5ml/3 kg IV IM SC	Ne pas utiliser : Glaucome - hypertrophie prostate arythmie tachycarde constipation suite à une atonie intestinale. sténose pylorique rétrécissement mécanique du tractus gastro-intestinal

Signes cliniques

Santé digestive

Troubles oesophagiens ou
gastriques
vomissements, reflux,
régurgitations, ulcères...

**VETGASTRIL®
PLUS**



Aide à maintenir l'équilibre
gastrique et favorise une
bonne digestion

Ingrédients :

- Feuilles d'Aloe barbadensis
- Kératine hydrolysée
- Alginate de sodium
- Hyaluronate de sodium
- Sulfate de chondroïtine
- Zinc

Troubles intestinaux
aigus
Diarrhée aigue,
dysbiose...

**DAFORTE®
PLUS**



Aide à soutenir l'équilibre
digestif chez les chiens et les
chats, notamment lors de
troubles digestifs passagers.

Ingrédients :

- Attapulgite
- *Lactobacillus acidophilus*
- *Limosilactobacillus reuteri*
(Inactif)
- *Lactisacibacillus
rhamnosus* (Inactif)
- Chlorure de potassium
- Chlorure de sodium
- Zinc

Troubles intestinaux
chroniques
Entérites chroniques, colite,
inflammation chronique...

**DIGEST®
PLASMORAL®**



Contribue au maintien d'une
fonction immunitaire intestinale
normale et aide à maintenir
l'équilibre du microbiote intestinal.

Ingrédients :

- Fructo-oligosaccharides
- Mannane oligosaccharides
- Protéines plasmatiques
- Enterococcus faecium
- Zinc
- Sélénium
- Vitamine B12

Troubles du transit
Constipation, boules de
poils, flatulences, mauvaises
odeurs des selles

VETREGUL®



Contribue à soutenir un
bon transit intestinal.

Ingrédients :

- Malt
- Fructo-oligosaccharides
- Yucca shidigera

Santé urinaire

Atteintes des voies
urinaires basses
Cystite idiopathique,
cystite bactérienne, SUF...

**URPRO®
PLUS
GEL**



Aide au bon fonctionnement
du système urinaire, en
particulier des voies urinaires
inférieures.

Ingrédients :

- Glucosamine
- D-mannose
- Fruit de canneberge rouge
- Prêle en poudre
- Tryptophane
- Sulfate de chondroïtine
- Acide hyaluronique